

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

REMARKS

Status of the claims:

With the above amendments, claims 3 and 11 have been amended. Claims 2-13, 17-19, and 22-40 are pending and ready for further action on the merits. No new matter has been added by way of the above amendments. The amendment to claim 3 is merely to add an "e)". Claim 11 has been amended to correct misspellings and to correct the amino acids and amino acid derivatives. Reconsideration is respectfully requested in light of the following remarks.

Rejections under 35 USC §103

Claims 2-9, 11, 13, 17-19, 22-35, and 38-40 are rejected under 35 USC §103(a) as allegedly being unpatentable over Hersh '791 (US Patent No. 5,667,791).

Claims 2, 6, 7, 9-12, 17-19, 28-31, and 34-40 are rejected under 35 USC §103(a) as allegedly being unpatentable over Hillebrand '500 (US Patent No. 5,296,500).

Present Invention

The present invention, as recited in claim 2, relates to a preparation for topical application comprising the following components:

- (a) at least one salt selected from alkali metal salts, alkaline earth metal salts and other minerals,
- (b) at least one amino acid in pure form,
- (c) zinc oxide and/or an inorganic peroxide, and
- (d) at least one secondary plant substance selected from the group consisting of carotinoids, phytosterols, saponins, polyphenols, flavonoids, terpenes, phytoestrogens, sulfides, phytin acid, dietary fibers and combinations thereof.

As recited in claim 3, the instant invention further comprises e) at least one polyunsaturated fatty acid of vegetable sources in addition to the components that are in claim 2.

Applicant has found that the combination of zinc oxide and/or inorganic peroxides improves the microcirculation in the cell. This improvement can be both visually and biometrically shown. The improvement is further increased by the use of at least one salt and at least one secondary plant substance.

Disclosure of Hersh '791

Hersh '791 discloses a composition of glutathione and selenomethionine in a topical carrier and method of using the composition to reduce and repair x-ray radiation-induced skin damage.

Hersh '791 fails to disclose a composition containing as

least one amino acid in pure form.

Disclosure of Hillebrand '500

Hillebrand '500 discloses a method for regulating wrinkles and/or atrophy in mammalian skin comprising treating the skin with a safe and effective amount of the amino acid derivative N-acetyl-L-cysteine and/or a derivative thereof.

Hillebrand '500 fails to disclose at least one amino acid in pure form.

Removal of the Rejections over Hersh '791 and Hillebrand '500

Applicant asserts that the Examiner has failed to make out a *prima facie* case of obviousness with regard to the 35 USC §103(a) rejections over Hersh '791 or Hillebrand '500. Three criteria must be met to make out a *prima facie* case of obviousness.

- 1) There must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or to combine reference teachings.
- 2) There must be a reasonable expectation of success.
- 3) The prior art reference (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations.

See MPEP §2142 and *In re Vaeck*, 20 USPQ2d 1438 (Fed. Cir. 1991). In particular, the Examiner has failed to meet the third element to make a *prima facie* obviousness rejection. Neither Hersh '791 nor Hillebrand '500 teach or suggest an amino acid in pure form.

Removal of the Rejections over Hersh '791

The Examiner asserts that Hersh '791 discloses EGF, which reads on "at least one amino acid". Applicant disagrees. Applicant respectfully submits that a claim can read on a reference but a reference cannot read on a claim. Moreover, Applicant respectfully directs the Examiner's attention to page 7, lines 8 et seq. of the instant written description, which recites:

The preparation of the present invention can contain all known amino acids and amino acid derivatives. Preferred amino acids and amino acid derivatives are alanine, phenylalanine, cysteine, cystine, proline, tyrosine, serine, histidine, glycine, leucine, isoleucine, valine, tryptophan, arginine, lysine, asparagine and glutamine.

Applicant respectfully points out that from this sentence it is apparent that an "at least one amino acid in pure form" does not refer to a protein but rather refers to at least one amino acid. The Examiner is reminded that claims are to be interpreted in light of the specification. See, e.g., *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 980, 34 USPQ2d 1321, 1329-1330 (Fed. Cir. 1995). In reading the claims in light of the

specification, it should be apparent to one of ordinary skill in the art that "at least one amino acid in pure form" refers to an individual amino acid and not to a protein.

Applicant also respectfully points out that in the above passage, Applicant differentiates between amino acids and amino acid derivatives. In the above-cited passage, Applicant refers to a series of compounds as amino acids or amino acid derivatives. Applicant respectfully points out that there are named naturally encoded amino acids and a naturally an encoded amino acid that has been post-translationally modified (*i.e.*, amino acid derivative (*i.e.*, cystine)). One of ordinary skill in the art would recognize that because this series of compounds is referred to as amino acids and amino acid derivatives, amino acids refer to naturally encoded amino acids and amino acid derivatives refer to non-naturally encoded amino acids or naturally encoded amino acids that have been post-translationally modified. This is further clear when one notes the passage that follows the above-cited passage (see page 7, lines 9-16), wherein a series of N-acetylated amino acids are given. These are described as being amino acid derivatives.

Thus, the Examiner should note that proteins are not named as amino acids. Moreover, selenomethionine, which is not a naturally encoded amino acid would be an amino acid derivative.

Applicant further submits five attached references (Exhibits 1-5) from textbooks that define what is meant by an "amino acid". In particular, the Examiner should note that in Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th edition, 1985 (Exhibit 2), the differences between an amino acid, a dipeptide and a protein are clearly delineated (see page 61 and 83). Moreover, on page 83, right hand column, the Examiner should note that there is a clear distinction between amino acids, amino acid salts, and amino acid derivatives.

Thus, in light of the above comments and the written description, it should be apparent to one of ordinary skill in the art that there is a difference between amino acids, amino acid derivatives, and proteins. "At least one amino acid in pure form" does not refer to amino acid derivatives, such as selenomethionine, or proteins, such as EGF. Thus, Herish '791 cannot render obvious the instant invention because Herish '791 fails to disclose the elements of the instant invention.

Herish '791 describes a composition for protection of X-ray induced skin damage in a suitable carrier for topical application wherein L-selenomethionine and glutathione are present in the carrier in specific concentrations.

When tissues are exposed to ionizing radiation, most of the gamma energy supplied by the X-ray source is absorbed by water contained within the cell resulting in the formation of hydrogen

and hydroxyl radicals. Certain antioxidants, particularly glutathione and caetyl-L-carnitine, as well as elemental selenium, the co-factor in the enzyme glutathione peroxidase can be applied in a suitable carrier to protect and treat the overlaying skin surface during radiation therapy (see column 1, lines 9 to 18).

Glutathione and selenium have been shown to play primary roles in the protection of carcinogenesis, the latter particularly in skin tumors when selenium is applied locally as selenomethionine or alternatively, some other thiol bond can be used (see column 2, lines 10-14 in Hersh '791). The invention of Hersh '791 deals with using GSH (glutathione) in combination with a selenium compound used topically to act as a free radical scavenger reducing radiation-induced skin changes. Glutathione peroxidase in the body requires selenium as a co-factor to exert its biological antioxidant function (see column 3, lines 32-33). Thus, when Hersh '791 uses selenomethionine in its composition, this selenomethionine is only for an elemental selenium donor and not for any effect that can be felt by the rest of the molecule. Thus, no suggestion of using an amino acid in pure form is present in Hersh '791. Accordingly, Applicants submit that there is no teaching or suggestion in Hersh '791 of utilizing "at least one amino acid in pure form".

Moreover, Applicants respectfully point out that there is no suggestion or teaching of using zinc oxide and/or an inorganic

peroxide in combination with "at least one amino acid in pure form". Hersh '791 is completely silent with respect to the use of any amino acid in pure form *per se*, and the combination of an amino acid in pure form with zinc oxide. The passage cited by the Examiner at column 9, line 31 to column 10, line 6 merely mentions the use of zinc oxide and its effects. However, there is nothing in this passage pointing to any combination of zinc oxide and an amino acid *per se*. For the above reasons, Applicant submits that Hersh '791 cannot render obvious the instant invention. The rejection is inapposite. Withdrawal of the rejection is warranted and respectfully requested.

Removal of the Rejection over Hillebrand '500

As pointed out above, Hillebrand '500 fails to disclose or suggest "at least one amino acid in pure form".

Hillebrand '500 describes a method for regulating wrinkles and atrophy in mammalian skin comprising treating the skin in need of such regulation with a safe and effective amount of a composition comprising (a) a safe and effective amount of N-acetyl-L-cysteine or a pharmaceutically acceptable salt thereof, and (b) a pharmaceutically acceptable carrier (see claim 1).

"Active compounds" in Hillebrand '500 means a compound having the structure as indicated in column 3, line 5. N-acetyl-L-cysteine has the structure as indicated in column 3,

line 45. In a preferred embodiment the composition of Hillebrand '500 is rendered substantially odorless by additionally comprising a zinc salt. Without being bound by theory, zinc most likely removes odor by complexing with malodorous H_2S , which may be formed as trace amounts of the decomposing active component (see column 3, last paragraph of Hillebrand '500). Preferably the zinc salt is selected from the group consisting of zinc oxide, zinc chloride, zinc acetate, zinc stearate and zinc sulfate (see column 4, lines 53 to 55 in Hillebrand '500). Other conventional skin care product additives may also be included in the compositions of Hillebrand '500. For example, collagen, hyaluronic acid, elastin, hydrolysates, prime rose oil, jojoba oil, epidermal growth factor, soybean saponins, mucopolysaccharides and mixtures thereof may be used (see column 7, penultimate paragraph in Hillebrand '500).

As was pointed out above, Hillebrand '500 fails to render *prima facie* obvious the instant invention because Hillebrand '500 fails to disclose "at least one amino acid in pure form" as is claimed in the instant invention.

Applicant respectfully points out that page 7, lines 16-18 of the instant written description recites:

Examples for amino acid derivatives are N-acetylated forms, e.g., N-acetyl-L-glutamine, N-acetyl-L-tyrosine, and N-acetyl-DL-tryptophan.

From this passage, it should be apparent to those of ordinary skill that N-acetylated amino acids are amino acid derivatives and not amino acids.

The Examiner asserts that Hillebrand '500 discloses N-acetylated-L-cysteine and presumably uses this compound for the teaching of "at least one amino acid in pure form". However, as was shown above, Applicant has distinguished between amino acids and amino acid derivatives. N-acetylated-L-cysteine is an amino acid derivative, which does not fit within the scope of "at least one amino acid in pure form" in the instant invention. Please also note the five submitted references (Exhibits 1-5), which define amino acids, amino acid derivatives, amino acid salts and proteins. These definitions show that these molecules (i.e., amino acids and amino acid derivatives) are not the same. In other words, an amino acid derivative is not the same as an amino acid. For this reason alone, the rejection is inapposite. Withdrawal of the rejection is warranted and respectfully requested.

Moreover, Hillebrand '500 gives no guidance for a person of ordinary skill in the art to combine an amino acid *per se* with zinc oxide or an inorganic peroxide. At column 7, the penultimate paragraph of Hillebrand '500 discloses a list of additives which optionally can be present in the provided compositions. However, there is no teaching or suggestion in

this passage to particularly combine soybean saponines, which is only one member of the provided list, specifically with an amino acid *per se* and zinc oxide. As is also acknowledged by the Examiner, only Example IV describes a composition comprising zinc oxide. However, this composition does not comprise any amino acid or any secondary plant substance as is recited in the present claims. Accordingly, Applicant asserts that the Examiner is "picking and choosing" to arrive at the instant invention. This is impermissible hindsight reconstruction. For this reason also, the rejection is inapposite. Withdrawal of the rejection is warranted and respectfully requested.

With the above remarks and amendments, Applicant believes that the claims, as they now stand, define patentable subject matter such that passage of the instant invention to allowance is warranted. A Notice to that effect is earnestly solicited.

If any questions remain regarding the above matters, please contact Applicant's representative, T. Benjamin Schroeder (Reg. No. 50,990), in the Washington metropolitan area at the phone number listed below.


Pursuant to the provisions of 37 C.F.R. §§ 1.17 and 1.136(a), Applicant respectfully petitions for a three (3) month extension of time for filing a response in connection with the present application. The required fee of \$475.00 is being filed concurrently with the Notice of Appeal.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By



Andrew D. Meikle, #32,868

BS
ADM/TBS/mua
0147-0220P

P.O. Box 747
Falls Church, VA 22040-0747
(703) 205-8000

Enclosures: Exhibits 1-5

RÖMPP

LEXIKON



Chemie

10., völlig überarbeitete Auflage

Herausgeber

Prof. Dr. Jürgen Falbe
Prof. Dr. Manfred Regitz

Bearbeitet von

Dr. Eckard Amelingmeier
Dr. Michael Berger
Dr. Uwe Bergsträßer
Prof. Dr. Alfred Blume
Prof. Dr. Henning Bockhorn
Prof. Dr. Peter Botschwina
Dr. Jörg Falbe
Dr. Jürgen Fink
Dr. Hans-Jochen Foth
Dr. Burkhard Fugmann
Prof. Dr. Susanne Grabley
Dr. Ubbo Gramberg
Dr. Herta Hartmann
Prof. Dr. Hermann G. Hauthal
Dr. Hans-Wolfgang Helb
Dr. Heinrich Heydt
Dr. Claudia Hinze
Dr. Kurt Hussong
Cornelia Imming

PD Dr. Peter Imming
Dr. Martin Jäger
Dr. Margot Janzen
Prof. Dr. Claus Klingshirn
Dr. Michael Krancher
Dr. Herbert Lämp
Dr. Susanne Lang-Fugmann
Dr. Michael Lindemann
Dr. Gisela Lück
Dr. Thomas Neumann
Dr. Gustav Penzlin
Dr. Reinhard Philipp
Dr. Matthias Rehahn
Dr. Karsten Schepelmann
Dr. Sabine Schlitte
Dr. Ralf Thiericke
Dr. Christa Wagner-Klemmer
Dr. Bernd Weber
Dr. Gotthelf Wolmershäuser



Georg Thieme Verlag
Stuttgart · New York

Redaktion:

Dr. Martina Bach
Ute Rohlf
Dr. Barbara Frunder
Georg Thieme Verlag
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart

Übersetzungen:

Karina Gobbatto
Jean-Louis Servant
Dr. Salvatore Venneri

Zolltarif-Codenummern:
Karl Kettmaker

Grafik:

Hanne Harasler
Kornelia Wagenblast
Ruth Hammelehle

Einbandgestaltung: Dominique Loenicker

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Römpp-Lexikon Chemie / Hrsg.: Jürgen Falbe ;
Manfred Regitz. Bearb. von Eckard Amelingmeier ... –
Stuttgart ; New York : Thieme

9. Aufl. u.d.T.: Römpp-Chemie-Lexikon
NE: Römpp, Hermann [Begr.]; Falbe, Jürgen [Hrsg]
Bd. 1. A–Cl. – 10., völlig überarb. Aufl. – 1996

1.–5. Auflage (1947–1962) Dr. H. Römpp
6. Auflage (1966) Dr. E. Uhlein
7. u. 8. Auflage (1972/1979) Dr. O.-A. Neumüller
9. Auflage (1992) Prof. Dr. J. Falbe u. Prof. Dr. M. Regitz

© 1996 Georg Thieme Verlag
Rüdigerstraße 14, D-70469 Stuttgart
Printed in Germany

Gesamtherstellung:
Konrad Tritsch GmbH
Graphischer Betrieb, Würzburg

Gedruckt auf Permaplan, archivierfähiges Werkdruck-
papier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff von Gebrüder
Buhl Papierfabriken, Ettlingen.

In diesem Lexikon sind zahlreiche Gebrauchs- und
Handelsnamen, Warenzeichen, Firmenbezeichnungen
sowie Angaben zu Vereinen und Verbänden, DIN-
Vorschriften, Codenummern des Zolltarifs, MAK- und
TRK-Werten, Gefahrklassen, Patenten, Herstellungs-
und Anwendungsverfahren aufgeführt. Alle Angaben
erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen.
Herausgeber und Verlag machen ausdrücklich darauf
aufmerksam, daß vor deren gewerblicher Nutzung
in jedem Falle die Rechtslage sorgfältig geprüft werden
muß.


Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN 3-13-734610-X (Band 1)
ISBN 3-13-107830-8 (Band 1–6)

1 2 3 4 5 6

Aminopyrin s. Aminophenazon.

Aminoquinurid.



Internat. Freiname für *N,N'*-Bis-(4-amino-2-methyl-6-chinoly)-harnstoff, $C_{21}H_{20}N_6O$, M_R 372,43, Zers. bei 255 °C. Es wurde als Mund-Antiseptikum 1934 von I. G. Farben patentiert u. ist in Kombination mit Tetracain Hydrochlorid von Hermal (Herviros®) im Handel. – *E* = *F* aminoquinuride – *I* aminochinuride – *S* aminoquinurida

Lit.: Hager (5.) 7, 155–157. – [CAS 3811-56-1]

Aminosäure-Austausch. Austausch einzelner Aminosäuren in einem Protein. Der Austausch kann auf genet. Ebene durch eine *Punktmutation (z. B. gezielt durch *site-directed-Mutagenese) hervorgerufen werden. Durch Austausch eines Nucleotids in einem Codon kann bei der *Translation eine andere Aminosäure eingebaut werden. Je nach Lage u. Eigenschaften der ausgetauschten Aminosäure innerhalb des Proteins ergeben sich unterschiedlich starke Auswirkungen auf seine Funktion.


Auch fertige Proteine od. Peptide können durch A.-A. gezielt verändert werden. Ein Beisp. mit industriellem Nutzen ist die Abspaltung der C-terminalen Aminosäure Alanin aus Schweine-Insulin mittels Trypsin. Diese wird im Folgeschritt durch Threonin ersetzt, um Human-Insulin zu erhalten. – *E* aminoacid exchange – *F* échange d'acides aminés – *I* scambio degli amminoacidi – *S* intercambio de aminoácidos

Lit.: Oxender u. Fox (Hrsg.), Protein Engineering, New York: A. R. Liss 1987.

Aminosäuren (Aminocarbonsäuren). Bez. für *Carbonsäuren mit einer od. mehreren Amino-Gruppen im Molekül. Im engeren Sinn versteht man darunter die 20 am Aufbau der Eiweißstoffe (*Proteine) beteiligten (*proteinogenen*) u. in *Nucleinsäuren kodierten, aber in der Natur auch frei vorkommenden L-A. (L-2-Aminocarbonsäuren). In reinem Zustand sind sie farblose, krist. Stoffe, die in festem Zustand u. in neutraler wäss. Lsg. überwiegend als *innere Salze* (*Zwitterionen) vorliegen, d. h. das chem. Gleichgewicht




liegt weit auf der rechten Seite. Dadurch sind hohe Schmp. (ca. 250 °C unter Zers.) u. geringe (am *isoelektrischen Punkt minimale) Löslichkeiten in unpolaren Lsm. bedingt. A. sind *amphot*, d. h. sie können sich als Säuren u. als Basen betätigen gemäß




Die Reste R werden Seitenketten od. Seitengruppen genannt. Man unterscheidet:


A. mit unpolaren Seitengruppen:



A. mit polaren ungeladenen Seitengruppen:



Saure A. (besitzen neg. geladene Seitengruppen):



Basische A. (besitzen pos. geladene Seitengruppen):




Abb.: Proteinogene Aminosäuren.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry



Fifth, Completely Revised Edition

Volume A 2:

Amines, Aliphatic to Antibiotics

Executive Editor: Wolfgang Gerhartz

Senior Editor: Y. Stephen Yamamoto

Editors: F. Thomas Campbell, Rudolf Pfefferkorn,
James F. Rounsaville



Numerical data, descriptions of methods or equipment, and other information presented in this book have been carefully checked for accuracy. Nevertheless, authors and publishers do not assume any liability for misprints, faulty statements, or other kinds of errors. Persons intending to handle chemicals or to work according to information derived from this book are advised to consult the original sources as well as relevant regulations in order to avoid possible hazards.

Production Director: Maximilian Montkowski
Production Manager: Myriam Nothacker

Library of Congress Card No. 84-25-829

Deutsche Bibliothek, Cataloguing-in-Publication Data:

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry / ed. Wolfgang Gerhartz ... [ed. advisory board Hans-Jürgen Arpe ...]. – Weinheim; Deerfield Beach, Florida; Basel: VCH Verlagsgesellschaft
Bis 4. Aufl. u. d. T.: Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie

NE: Gerhartz, Wolfgang [Hrsg.]; Encyclopedia of Industrial Chemistry

Vol. A. Alphabetically arranged articles.

2. Amines, aliphatic to antibiotics / executive ed.: Wolfgang Gerhartz ... – 5., completely revised ed. – 1985.

ISBN 3-527-20102-5 (Weinheim)

ISBN 0-89573-152-5 (Deerfield Beach, Florida)

© VCH Verlagsgesellschaft mbH, D-6940 Weinheim (Federal Republic of Germany), 1985.

Distribution: VCH Verlagsgesellschaft, P.O. Box 12 60/12 80. D-6940 Weinheim (Federal Republic of Germany)
USA and Canada: VCH Publishers, 303 N.W. 12th Avenue, Deerfield Beach FL 33442-1705 (USA)

All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form — by photoprint, microfilm, or any other means — transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers.

Authorization to photocopy items for internal or personal use, or the internal or personal use of specific clients, is granted for libraries and other users registered with the Copyright Clearance Center (CCC) Transactional Reporting Service, provided that the base fee of \$ 1.00 per copy, plus \$ 0.25 per page is paid directly to CCC, 27 Congress Street, Salem, MA 01970. 0740-9451/85 \$1.00 + 0.25.
Registered names, trademarks, etc. used in this book and not specifically marked as such are not to be considered unprotected.

Cover design: Wolfgang Schmidt

Composition, printing, and bookbinding: Graphischer Betrieb Konrad Triltsch, D-8700 Würzburg
Printed in the Federal Republic of Germany

Amino Acids

AXEL KLEEMANN, WOLFGANG LEUCHTENBERGER, BERND HOPPE, HERBERT TANNER, Degussa AG, Hanau-Wolfgang, Federal Republic of Germany


Introduction and History	57	2.2.16. Tryptophan	73
1. Properties	61	2.2.17. Tyrosine	74
1.1. Physical Properties and Structure	61	2.2.18. Valine	74
1.2. Chemical Properties	64	3. Biochemical and Physiological Significance	74
2. Production	66	4. Uses	76
2.1. General Methods	66	4.1. Human Nutrition	76
2.1.1. Methods for D,L-Amino Acids	66	4.1.1. Supplementation	77
2.1.2. Methods for L-Amino Acids	67	4.1.2. Flavorings, Taste Enhancers, and Sweeteners	79
2.1.3. Methods for D-Amino Acids	69	4.1.3. Other Uses in Foodstuff Technology	80
2.2. Production of Specific Amino Acids ..	69	4.2. Animal Nutrition	80
2.2.1. Alanine	69	4.3. Pharmaceuticals	82
2.2.2. Arginine	69	4.3.1. Nutritive Agents	83
2.2.3. Aspartic Acid and Asparagine	69	4.3.2. Therapeutic Agents	83
2.2.4. Cystine and Cysteine	69	4.4. Cosmetics	88
2.2.5. Glutamic Acid and Glutamine	70	4.5. Agrochemicals	88
2.2.6. Glycine	70	4.6. Industrial Uses	88
2.2.7. Histidine	70	5. Chemical Analysis	89
2.2.8. Isoleucine	70	6. Economic Significance	90
2.2.9. Leucine	70	7. Toxicology	91
2.2.10. Lysine	71	8. References	92
2.2.11. Methionine	71		
2.2.12. Phenylalanine	72		
2.2.13. Proline	72		
2.2.14. Serine	72		
2.2.15. Threonine	73		

Introduction and History

The proteins, although they occur in an almost infinite variety, are composed of a relatively small number of basic building blocks, all α -amino acids. In addition, the amino acids fulfill certain regulatory functions in the metabolism and are required for the biosynthesis of other functional structures. This review is limited, for the most part, to the protein-forming α -amino acids, because they are by far the most widely distributed in nature and are of considerable economic interest.

The ca. 20 different α -amino acids found in proteins are rather simple organic compounds, in which an amino group and a side chain (R) are attached alpha to the carboxyl function. The R

group may be aliphatic, aromatic, or heterocyclic and may possess further functionality. At present over 200 naturally occurring α -



amino acids are known [1]–[3], [11]. Table 1 (pp. 58–59) shows the structures of the α -amino acids found in proteins, where they occur exclusively as the L-enantiomers. D-Amino acids have been found only in the cell walls of some bacteria, in peptide antibiotics, and in the cell pools of some plants [6], [12], [13]. Table 2 lists some amino acids and derivatives that do not occur in proteins.


History. The history of amino acid chemistry began in 1806, when two French investigators, VAUQUELIN and ROBIQUET, isolated asparagine from asparagus juice. It was not until 1925 that SCHRYVER and BURTON isolated threonine from oat protein, the last discovered of the ca. 20 protein-forming amino acids. STRECKER synthesized alanine in 1850 from acetaldehyde and hydrogen cyanide. ESCHER established the hypothesis of essential amino acids. EMIL FISCHER discovered that the amino acids were building blocks of the proteins. ABDERHALDEN synthesized threonine from acrylic acid derivatives and methanol. ROSE et al. recognized threonine as the last of the eight essential amino acids. D,L-Methionine was produced industrially in Germany in 1948, and in 1956 L-glutamic acid was produced by fermentation in Japan.

Origin of Amino Acids. The first amino acids were probably produced on the earth more than 3×10^9 years ago via "prebiotic synthesis" in the primordial atmosphere. The concept of prebiotic synthesis is based on laboratory experiments in which glycine, alanine, aspartic acid, glutamic acid, and other compounds were produced by the action of an electrical discharge on a simulated primordial atmosphere consisting of methane, hydrogen, water, and ammonia [14]. Since then, traces of amino acids have been detected in moon rocks, meteorites, and interstellar space.

1. Properties

1.1. Physical Properties and Structure

α -Amino acids are nonvolatile, white, crystalline compounds with no defined melting points. They are relatively stable on heating, generally decomposing at 250–300 °C. Both the low volatility and the thermal stability result from the low-energy dipolar structure (zwitterion, inner salt, betaine), which the amino acids assume in the solid state.




Evidence for this structure is provided by infrared and Raman spectra in which the bands typical of $-\text{NH}_2$ and $-\text{COOH}$ moieties are absent. Equilibrium in solution also lies almost exclusively on the side of the dipolar form; therefore, amino acids are insoluble in nonpolar solvents

and usually not very soluble in polar ones. The only amino acids that exhibit any appreciable solubility in alcohol are proline and hydroxyproline. Solubility in water depends on the pH: the minimum is at the isoelectric point.


This solubility minimum at the isoelectric point is quite useful for purifying and recrystallizing amino acids. The analytical technique for separating amino acid mixtures by electrophoresis is based on the fact that a specific amino acid does not migrate in an electric field at its isoelectric point, pI, a physical constant for each amino acid.

The physical properties of the most important α -amino acids are listed in Table 3.

Stereochemistry. With the exception of glycine, the simplest amino acid ($\text{R} = \text{H}$), all natural α -amino acids are chiral compounds occurring in two enantiomeric (mirror-image) forms.



The prefixes L and D express the absolute configuration about the α -carbon atom by means of the formal stereochemical relationship to L- or D-glyceraldehyde, the reference substance introduced by EMIL FISCHER in 1891. In addition to the spacial representations shown above, the so-called Fischer projections are also universally recognized and used:



Polarimetric determination of the specific rotation $[\alpha]_D^t$ can be used to differentiate between the two enantiomers and to check their optical purity. The molecular rotation $[M]_D^t$ is less common:

$$[M]_D^t = \frac{M_r}{100} \cdot [\alpha]_D^t$$

M_r , molecular mass; t , temperature; D 589.3 nm (wavelength of the sodium D line)

Further methods for investigating the structure of amino acid enantiomers include the Cotton effect (change in molecular rotation as a function of the wavelength of plane-polarized light), optical rotational dispersion (reversal of the direction of the molecular rotation at the wavelength of the absorption maximum), and circular dichroism (differing absorption for left- and right-handed circularly polarized light). L-Amino acids exhibit a positive carbonyl Cotton effect, D-amino acids a negative one.

Isoleucine, threonine, and hydroxyproline contain two chiral carbon atoms each; therefore, they appear in four stereoisomeric forms. Cystine, which likewise contains two chiral carbons, has only three stereoisomers: L-, D-, and

nized clearly, and considerable growth can be predicted.

4.3.1. Nutritive Agents

Infusion Solutions. Parenteral nutrition with L-amino acid infusion solutions is a well-established component of clinical nutrition therapy. A standard infusion solution contains the eight classical essential amino acids, the semi-essential amino acids L-arginine and L-histidine, and several nonessential amino acids, generally glycine, L-alanine, L-proline, L-serine, and L-glutamic acid.

Also available are special infusion solutions tailored to the requirements of particular groups, such as newborn infants, seniors, or patients with an extreme negative nitrogen balance. Solutions rich in the branched-chained amino acids leucine, isoleucine, and valine and poor in methionine and aromatic amino acids are available for liver-disease patients. Solutions containing only essential amino acids are available for kidney patients. Enzymatic protein hydrolysates, which were used as infusion solutions until a few years ago, have disappeared almost completely from the market. They were not available in the optimal composition, and there were often compatibility problems. Only pure, crystalline L-amino acids are used in modern infusion solutions. The solutions (up to 10%), which also contain electrolytes in addition to amino acids, are sterile and pyrogen-free.

The simultaneous administration of carbohydrates is necessary for optimal utilization of the amino acids. Glucose is normally a separate infusion. Some commercially available amino acid infusion solutions contain an energy source in the form of sugar alcohols (sorbitol, xylitol), which do not enter into a Maillard reaction with the amino acids.

Normally, parenteral nutrition is only practiced over a limited time. In principle, however, total parenteral nutrition over many years is possible. In such a case, all essential nutrients (unsaturated fatty acids, vitamins, and trace elements) must be provided.

Elemental Diets. Enteral nutrition is also a means of providing the essential nutrients [222]. Elemental diets, which were developed originally for the astronauts [223], contain chemically defined nutritive components. In addition to free amino acids the mixtures generally contain carbohydrates, fats, minerals, and vitamins in a combination adapted to the requirements. In many cases, elemental diets are used as an alternative and supplement to parenteral nutrition. They have high nutritional value and are totally resorbable. They are largely independent of the digestive function of the pancreas and reduce the intestinal bacteria flora. Amino acid elemental diets generally are used in cases of anatomic, functional, or enzymatic defects [224].

Formula diets based on peptides currently are gaining ground as an alternative to elemental diets based on L-amino acids. According to recent studies [225], short-chained peptides are resorbed rapidly via a peptide transport system in the gut, therefore in a process that is inde-

pendent of amino acid transport. Recently, compositions of nitrogen-free amino acid analogues (keto acids and hydroxy acids) have come into use for the special case of kidney insufficiency (chronic renal failure).


Elemental diets or formula diets are administered orally or via a nasogastric tube directly into the gastrointestinal tract.

4.3.2. Therapeutic Agents

Many therapeutic agents are derivatives of natural or nonnatural amino acids. Examples are benzerazide, captopril, and dextrothyroxine. They are described under keywords such as Spasmolytics, Blood Pressure Affecting Agents, or Thyrotherapeutic Agents. Only therapeutically useful amino acids and simple derivatives are treated here.

Amino Acids and Salts. The amino acids and their simple salts that are currently important therapeutic agents are compiled in Table 20. The proprietary names listed represent only a selection.


N-Acetylcysteine [616-91-1], $C_5H_9NO_3S$, M_r 163.2, mp 109–110 °C, $[\alpha]_D^{20} + 5^\circ$ ($c = 3$, H_2O), is a mucolytic and secretolytic agent.



It is prepared by reaction of cysteine hydrochloride monohydrate with acetic anhydride in the presence of sodium acetate [226], [227].

Trade names: Fluimucetin (Inpharzam, FRG), Flui-mucil (Inpharzam, FRG; Zambon, Italy), Mucolyticum "Lappe" (Lappe, FRG), Mucomyst (Allard, France; Mead Johnson, USA), Airbron, Parvolex (Duncan Flockhart, UK).

Carbocysteine (carbocysteine) [638-23-3], S-carboxymethyl-L-cysteine, $C_5H_9NO_4S$, M_r 179.2, mp 204–207 °C (decomp.), $[\alpha]_D^{20} - 34.0$ to -36.0° ($c = 10$, H_2O), is used to treat disorders of the respiratory tract associated with excessive mucus.



Synthesis involves S-alkylation of L-cysteine with chloroacetic acid in the presence of sodium hydroxide [228], [229].

Univ.-Professor, Dr. phil., Mag. pharm.
Artur Burger
Institut für Pharmakognosie
Universität Innsbruck
A-6020 Innsbruck
artur.burger@uibk.ac.at
http://info.uibk.ac.at/6676713

Univ.-Professor, Dr. phil., Dr. h.c., Mag. pharm.
Helmut Wachter
Institut für Medizinische Chemie und Biochemie
Universität Innsbruck
A-6020 Innsbruck

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Hunnius pharmazeutisches Wörterbuch. - 8., neu
bearb. und erw. Aufl. / von Artur Burger und Helmut Wachter. -
Berlin : de Gruyter, 1998
ISBN 3-11-016792-6 brosch.
ISBN 3-11-016793-4 Geb.

Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch

8. Auflage

neu bearbeitet und erweitert
von Artur Burger
und Helmut Wachter

EXHIBIT

3

E3

© Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem und säurefreiem Papier, das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

Copyright © 1997 by Walter de Gruyter & Co., D-10785 Berlin. - Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Kenntnisse über Arzneistoffe sind einem ständigen Wandel unterworfen. Davon zeugen Neuentwicklungen von Wirkstoffen, neue Indikationsstellungen, bereits bekannter Wirkstoffe aber auch die Rücknahme aller und neuer Arzneimittel aus dem Handel. Der Benutzer dieses Wörterbuchs wird daher darauf hingewiesen, daß er in eigener Verantwortung festzustellen hat, ob die im vorliegenden Werk genannten Angaben zu Arzneistoffen hinsichtlich Anwendung, Dosierung, Kontraindikationen, unerwünschter Wirkungen usw. dem aktuellen Wissensstand entsprechen. Im allgemeinen sind die verlässlichsten Quellen die behördlich geprüften Beipackzettel der Arzneimittel (Fach- bzw. Lateininformation).

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dergleichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.

Satz, Strukturformeln, Schema, Knipp Medien und Kommunikation: Dörflinger
Grafische Gestaltung: S. Grunenberg, N. Hildisch, H. Holtermann, O. Scharf, L.-O. Walter, H. Wals,
K. Zander, Berlin
Layout: Ingrid Walter, Berlin
Druck und Bindung: Perzel, Pölla
Einbandgestaltung: Rudolf Hübler, Berlin
Printed in Germany



Walter de Gruyter · Berlin · New York 1998


form u. Ethanol. Off: Ph.Eur. 1. OAB90. Anw.: Analgetikum, Antipyretikum, Antirheumatikum. Ubl. Dos.: 0,1 bis 0,5 g/d in mehreren Einzeldosen, auch i.v. Anw. möglich. Nebenw.: allerg. Reaktionen von Hauterscheinungen bis zu tödlichen Aggranulozytosen in hohen Dosen. Kampfgift (LD 10 g). Aufgrund der Bildung von krebserregenden Dimethylnitrosamin aus der abgespaltenen Dimethylamino-Gruppe nicht mehr in Verwendung.

3-Aminophenol: C_6H_7NO , M, 109,13. Schmp. ca. 122°C. Weißes bis schwach gelb gefärbtes, krist. Pulver; lsl. in Wasser u. Ethanol; verfärbt sich durch Feuchtigkeit u. Lichteinfluß.

4-Aminophenol: C_6H_7NO , M, 107,10. Schmp. 186°C unter Zers. Farblose Kristalle (an Licht graubraun bis violettbraun werdend); lsl. in absolut. Ethanol, wenig lsl. in Wasser. Anw. techn.: zum Färben von Haaren u. Pelzen, (früher) als Photograph. Entwickler (Rodinal®). Anw.: Reagens Ph.Eur. 8.

2-Amino-2-phenylpropionsäure: s. Phenylglycin.
Aminophyllin®: s. Theophyllin-Ethylendiamin.

Aminoplaste: Alkamat®. Duroplaste mit unterschiedlichen Beimengungen (Füllstoffen). Es ist zu unterscheiden zwischen Harstoff-Formaldehydharzen u. den bestandigeren Melamin-Formaldehydharzen. Dienen zur Herst. v. Schraubverschleißtasen f. Arznelgläser.



Aminopterin INN: 4-Aminopteroylglutaminsäure, 4-Aminofolsäure; M, 440,43. Anw.: als Zytostatikum (Folsäureantagonist), s.a. Methotrexat.

2-Aminopyridin: $C_5H_6N_2$, M, 94,1. Farblose Kristalle. Schmp. 56°C, Sdp. 204°C. Lsl. in Wasser u. fast allen organischen Lösungsmitteln. Anw.: f. Wirkstoffsynthesen.

Aminopyrimidin: s. Aminophenazon.

Aminosäuren: Amino-carbon-säuren, organische Säuren, die eine Carboxyl- u. eine Amino-Gruppe enthalten. Je nach der Stellung der NH₂-Gruppe in der Kohlenstoffkette zu der endständigen Carboxylgruppe unterscheidet man α-, β-, γ-...Aminosäuren. Die α-Aminosäuren haben als Bausteine der Proteine u. Peptide, jedoch auch in freier Form, zu den wichtigsten organischen Stoffen der lebenden Zelle. Proteine (proteinbildende) A. sind am Proteinbau beteiligt (insgesamt ca. 20). Sie sammeln sich in der Zelle in einem Aminosäurepool, in dem sich mit der Nahrung aufgenommene, im Stoffwechsel synthetisierte u. durch Proteinabbau anfallende A. mischen. In diesem Pool befinden sich auch stichstoffhaltige Vor- u. Zwischenstufen der Biosynthese der proteogenen u. nichtproteogenen A. Nichtproteogene A. sind am Aufbau der Proteine gewöhnlich nicht

beteiligt. Dazu gehören auch A., die als Zwischenprodukte bei der Biosynthese proteogener A. auftreten.

Die chemische Klassifizierung der A. erfolgt 1. nach der Lage des isoelektrischen Punktes (neutrale, saure u. basische A.) od. 2. nach der Polarität ihrer Seitenketten; danach kann man 4 Hauptgruppen von A. unterscheiden: a) unpolare, b) polare ungeladene A. (Serin, Threonin, Tyrosin, Asparagin, Glutamin, Cystein, Glycin); c) positiv geladene A. (Lysin, Arginin u. Histidin); d) negativ geladene A. (Asparaginsäure u. Glutaminsäure).

Neben der chem. Klassifizierung werden A. 3. nach den Abbauprodukten im Stoffwechsel in glucoplastische u. ketoplastische A. unterteilt; glucoplastische A. können zu C-Dicarbonsäuren od. zu Brenztraubensäure abgebaut u. in Kohlenhydrate umgewandelt werden, während ketoplastische A. zu Ketokörpern, speziell zu Acetessigsäure, abgebaut werden. Schließlich unterscheidet man zwischen 4. essentiellen u. nichtessentiellen A., wobei erstere vom betreffenden Organismus nicht od. nur ungenügend durch Biosynthese bereitgestellt werden können u. daher mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Essentielle A. sind Tryptophan, Threonin, Isoleucin, Lysin, Valin, Leucin, Methionin, Phenylalanin. Außer den 20 A., die gewöhnlich in Proteinen vorkommen, gibt es noch einige, die in nur geringer Menge in einigen speziellen Proteinen gefunden wurden, z.B. 4-Hydroxyprolin u. 5-Hydroxylysine, das im fibrillären Protein Kollagen u. N-Methyllysine, das im Muskelprotein Myosin vorkommt. Außerdem gibt es noch viele andere A., die niemals als Proteinbestandteile auftreten, sondern biol. in freier od. anders kombinierter Form existieren, wie z.B. Ornithin u. Citrullin, die Zwischenprodukte im Harnstoffzyklus sind.

Eigenschaften: Monammoniumcarboxylsäuren sind amphoter. Im festen Zustand u. in stark polaren Lösungsmitteln liegen sie als Zwitter-Ionen ($NH_3^+CH(R)COO^-$) vor. Sie lösen sich mit wenigen Ausnahmen in Wasser, Ammoniak u. anderen polaren Lösungsmitteln gut, dagegen in unpolaren u. wenig polaren Lösungsmitteln wie z.B. Ethanol, Methanol u. Aceton sehr schwer. Am isoelektrischen Punkt (pH-Bereich 4 bis 9) ist die Wasserlöslichkeit der A. am geringsten, da durch die Zwitterionensstruktur die Hydrophilie der Amino- u. Carboxylgruppe aufgehoben ist. Im stärker sauren pH-Bereich liegen die A. als Kationen ($NH_3^+CH(R)COOH$), im stärker alkalischen pH-Bereich als Anionen ($NH_2CH(R)COO^-$) vor. Die A. kommen in der Natur aufgrund eines od. zweier asymmetrischer C-Atome als opt. aktive Verbindungen vor (außer Glycin) u. haben meist gefärbte Derivate. Komplexe Mischungen von A. können mittels der Papierchromatographie od. der Ionenaustausch-Chromatographie getrennt, identifiziert u. bestimmt werden. Mehrere A. können kovalent zu Peptiden* verknüpft werden. Diese können andererseits auch bei der unvollständigen Hydrolyse von Proteinen* entstehen.

Biosynthese: Der Mensch kann 10 der 20 proteogenen A. selbst synthetisieren. Die essentiellen A. werden von Pflanzen u. Bakterien synthetisiert. Nach der Herkunft des Kohlenstoffgerüsts lassen sich bei der Biosynthese der proteogenen A. mehrere biogenetische Gruppen

Aliphatische Aminosäuren		
Neutrale Aminosäuren		
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
Glycin (Gly)	L-Serin (Ser)	L-Alanin (Ala)
$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Threonin (Thr)	L-Valin (Val)	L-Isoleucin (Ile)
Saurer Aminosäuren und ihre Amide		
$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Asparaginsäure (ASP)	L-Asparagin (Asp)	L-Glutaminsäure (Glu)
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{C=O} \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{C=O} \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{C=O} \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Glutamin (Gln)	L-Glutamin (Gln)	L-Glutamin (Gln)
S-haltige Aminosäuren		
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{SH} \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{S}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{S}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Cystein (Cys)	L-Cystin (Cys)	L-Methionin (Met)
Basische Aminosäuren		
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Lysin (Lys)	L-Arginin (Arg)	L-Hydroxylysin (Hyl)
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Ornithin	L-Citrullin	L-Ornithin
Heterocyclische Aminosäuren		
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Tryptophan (Try)	L-Histidin (His)	L-Hydroxyprolin (Hyp)
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Prolin (Pro)	L-Phenylalanin (Phe)	L-Tyrosin (Tyr)
Aromatische Aminosäuren		
$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4- \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4- \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4- \\ \\ \text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$
L-Tyrosin (Tyr)	L-Phenylalanin (Phe)	L-Tyrosin (Tyr)


ab: 1. Die Serinfamilie, die die sich aus Triose-phosphat ableitenden A. Serin, Glycin, Cystein u. Cytidin umfaßt. 2. Die Ketoglutaratfamilie enthält die A., die ihr Skelett aus dem Ketoglutarat des

Triarbsäurezyklus beziehen, nämlich Glutamat, Glutamin, Ornithin, Citrullin, Arginin, Prolin u. Hydroxyprolin. 3. In der Pyruvatfamilie die A., die ihr Skelett aus dem Ketoglutarat des



Aminosäuren, Peptide, Proteine

Die Aminosäure ist der Grundbaustein jedes Eiweißkörpers oder Proteins (*proteinogene Aminosäuren*). Korrekt bezeichnet handelt es sich um α -Aminocarbonsäuren, die eine α -Aminogruppe ($-\text{NH}_2$) und eine Carboxylgruppe ($-\text{COOH}$) enthalten.



$\text{R} = \text{H}, \text{CH}_3, \text{PhCH}_2, \text{etc.}$

Die proteinogenen Aminosäuren haben eine gemeinsame Grundbauweise, unterschiedliche Aminosäuren unterscheiden sich nur durch ihre Seitenketten R.

EXHIBIT

4

12. Aminosäuren 01 2

Aminosäuren, Peptide, Proteine



α -Aminocarbonsäuren

Natürliche Aminosäuren
sind chiral und
besitzen S-Konfiguration

20 proteinogene Aminosäuren,
natürlich vorkommende
Aminosäuren, die zum Aufbau
von Peptiden und Proteinen
dienen

Beispiele für proteinogene Aminosäuren

R	Trivialname	Abkürzung
H	Glycin	Gly
$-\text{CH}_3$	Alanin	Ala
$-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	Valin	Val
$-\text{CH}_2\text{OH}$	Serin	Ser
$-\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$	Tyrosin	Tyr
$-\text{CH}_2\text{CO-NH}_2$	Asparagin	Asn
$-(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2$	Lysin	Lys
$-\text{CH}_2\text{SH}$	Cystein	Cys
$-\text{CH}_2\text{COOH}$	Asparaginsäure	Asp
$-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	Glutaminsäure	Glu

20 proteinogene Aminosäuren

3-Buchstaben-, 1-Buchstabensymbole

3-Buchstaben	1-Buchstabe	Strukturformel
Glycin	Gly	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
Alanin	Ala	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Valin	Val	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Leucin	Leu	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Isoleucin	Ile	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Serin	Ser	$\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Threonin	Thr	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Cystein	Cys	$\text{HSCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Methionin	Met	$\text{CH}_3\text{SCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Prolin	Pro	$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Phenylalanin	Phe	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Tyrosin	Tyr	$p\text{-HO-C}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Tryptophan	Trp	$\text{HOOC-(H}_2\text{N)HC-H}_2\text{-C}_5\text{H}_4\text{NH}$
Asparagin	Asn	$\text{NH}_2\text{CO-CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Glutamin	Gln	$\text{NH}_2\text{CO-CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Asparaginsäure	Asp	$\text{HOOC-CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Glutaminsäure	Glu	$\text{HOOC-CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Arginin	Arg	$\text{HN=C(NH}_2\text{)-NH-CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Lysin	Lys	$\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$
Histidin	His	$\text{HOOC-(H}_2\text{N)HC-H}_2\text{-C}_5\text{H}_4\text{NH}$

Die Aminosäuren werden eingeteilt in:

neutrale Aminosäuren: Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin


saure Aminosäuren: Asparaginsäure (Aspartat), Asparagin, Glutaminsäure (Glutamat), Glutamin

basische Aminosäuren: Lysin, Arginin


funktionelle und heterocyclische Aminosäuren: Serin, Threonin, Cystein, Tyrosin, Prolin, Tryptophan, Histidin

Neutrale, saure, basische und funktionelle Aminosäuren


neutrale AS




saure AS



basische AS



funktionelle AS



Isoleucin

Lysin

7

Glycin ist die einfachste Aminosäure. Alanin besitzt eine Methyl-Gruppe (CH_3) als Seitenkette. Valin, Leucin und Isoleucin zählen zu den neutralen Aminosäuren, deren Seitenketten bedingen ihren apolaren Charakter. Sie zählen zu den für den Menschen essentiellen Aminosäuren. Prolin ist im Gegensatz zu den anderen Aminosäuren eine sekundäre Aminosäure oder Iminosäure. Die eigentliche Seitenkette ist ein Six-Member-Ring der Amino-Gruppe gebunden. Die dadurch bedingte Ringstruktur hat einen großen Einfluss auf die dreidimensionale Struktur von Proteinen. Phenylalanin gehört zu der Gruppe der aromatischen Aminosäuren. Sie zählt zu den für den Menschen essentiellen Aminosäuren. Tyrosin ist eine aromatische Aminosäure. Sie zählt zu den für den Menschen essentiellen Aminosäuren. Tyrosin ist eine aromatische Aminosäure und unterscheidet sich von Phenylalanin durch eine phenolische Hydroxygruppe. Sie ist deutlich polarer als Phenylalanin und auch Tyrosin. Asparagin und Glutamin sind Säureamide der sauren Aminosäuren Asparaginsäure und Glutaminsäure. Asparagin und Glutamin liegen beim physiologischen pH-Wert ungeladen vor und zählen zu den hydrophilen Aminosäuren. Die Seitenketten der Asparaginsäure und Glutaminsäure sind beim physiologischen pH-Wert negativ geladen, daher auch die übliche Bezeichnung Aspartat und Glutamat. Arginin und Lysin enthalten jeweils eine stark basische Seitenkette und sind bei neutralem pH-Wert positiv geladen. Lysin zählt zu den für den Menschen essentiellen Aminosäuren. Die polare Seitenkette des Histidins liegt je nach Umgebung im Protein ungeladen oder positiv geladen vor. Histidin findet sich häufig im aktiven Zentrum von Enzymen. Der Indolring der Serotonine kann zwischen den Ionsenformaten hin- und herschalten, ein wichtiger Umwand bei der Katalyse von Lösung und Knüpfung von Bindungen.

12. Aminosäuren 02 6

Essentielle Aminosäuren



Für den Menschen gelten acht der zwanzig proteinogenen Aminosäuren als *essentiell*, da sie vom Körper nicht aufgebaut werden können und daher mit der Nahrung aufgenommen werden müssen.

Die essentiellen Aminosäuren sind Valin, Leucin, Isoleucin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin, Threonin und Lysin.

8

Zwitterionische Struktur

$$\text{pK}_a = 2 - 5$$




$$\text{pK}_a = 10 - 11$$

Isoelektrischer Punkt:

Zahl der positiv geladenen Aminosäuremoleküle =
Zahl der negativ geladenen

Peptide, Proteine, Eiweißstoffe

Peptide sind Dimere, Trimere, Tetramere bis Oligomere von Aminosäuren, die durch die sog. Peptidbindung miteinander verknüpft sind.
Bei den Proteinen, auch Eiweiße genannt, handelt es sich um entsprechende hochpolymere Verbindungen, die aus proteinogenen Aminosäuren aufgebaut sind. Sie erfüllen eine Vielzahl von lebensnotwendigen Funktionen in jedem Lebewesen.



Aktivierung und Schutzgruppentechnik erforderlich:


⇒ Aufbau einer Aminosäuresequenz
⇒ Primärstruktur

Synthese des Dipeptids Gly-Ala

Jewells zwei funktionelle Gruppen, daher

⇒ auch Kombinationen Ala-Ala, Gly-Gly, Ala-Gly möglich

⇒ Schutzgruppentechnik




13

12. Aminosäuren 04 14

Bildung von Peptiden

Primärstruktur am Beispiel eines Tripeptids




Ala - Ser - Cys
⇒ Aminosäuresequenz oder Primärstruktur


15

16


● Abspaltung der Boc-Schutzgruppe




● Schutz der Carboxylgruppe in Ala



● Abspaltung der Benzylgruppe





KLINISCHES WÖRTERBUCH

mit klinischen Syndromen
und einem Anhang Nomina Anatomica

von
Professor Dr. med. Dr. phil.
Willibald Pschyrembel

Gegründet von Otto Dornblüth

253., um einen Anhang Nomina Anatomica erweiterte Auflage
Mit 2293 Abbildungen im Text



1977

5777 3

Amido-: s. Amino-.

Amikrobiosis intestinalis (de Rudder): Vollst. Fehlen v. Darmbakterien (Darmflora) insbes. nach Behandlg. mit Antibiotika.

Amikronen: Im Ultramikroskop nicht mehr erkennbare Teilchen (Durchmesser unter 1 μ).

Amimie: Fehlen d. Mienenspiels (motor. A., atakt. A.) bzw. Nichtverstehen d. Mimik anderer (sensor. A.).

Amindiabetes: s. Aminosäurediabetes.

Amine: Abkömmlinge d. Ammoniaks, indem ein od. mehrere H-Atome durch Alkyl- od. Arylreste ersetzt sind. **Primäre** mit d. Gruppe $-\text{NH}_2$ (Methylamin CH_3-NH_2) entstehen durch Ersatz eines, sekund. mit d. Gruppe $-\text{NH}$ (Dimethylamin $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$) durch Ersatz v. zwei, tert. mit $\equiv \text{N}$ (Trimethylamin) durch Ersatz aller drei H-Atome. **Quartäre Ammoniumbasen*** mit d. Gruppe $\equiv \text{N}^+$ lassen sich v. Ammoniumhydroxyd NH_4OH ableiten. A., biogene (Guggenheim): Klasse von Stoffen, die durch Dekarboxylierung* von Aminosäuren entstehen. Viele b. A. haben pharmakologische Wirkungen (z. B. Histidin* \rightarrow Histamin*), sind Teile von Coenzymen (z. B. Cystein* \rightarrow Cysteamin*) oder Vorstufen von Hormonen (5-Hydroxy-tryptophan \rightarrow Serotonin*). Vgl. Monoaminoxidase, MAO-Hemmstoffe.

Aminoazidurie (acidum Säure, ούρον Harn): Angeb. od. erworbene Ausscheidung von Aminosäuren* im Urin. Der Aminosäurespiegel im Serum schwankt ziemlich konstant um 4,2 mg%. Normalerweise werden nur 1–2% der aufgenommenen Aminosäuren im Urin ausgeschieden. Vgl. Hyperaminoazidurie.

p-Aminobenzoesäure (PAB):

$\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ Unentbehrlicher, noch in der Verdünnung von 10^{-11} wirks. Wuchsstoff für Organismen, die Folsäure (s. Vitamin-B-Komplex) synthetisieren können (Bakterien). Das Enzymsystem, das PAB in die Folsäure einbaut, kann durch die Derivate d. Sulfanilamid $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2\text{NH}_2$ (= Sulfonamide*) gehemmt werden (s. Antimetaboliten, Antivitamin). Ursache der selektiven Toxizität (Bakteriostase* ohne Wirtsschädigung) d. Sulfonamide: Bei den Bakterien Unterbrechung der Folsäuresynthese; bei Tier u. Mensch ist Folsäure ein Vitamin, da Synthese nicht möglich. — Die PAB ist ferner d. Grundkörper e. Reihe v. Lokalanästhetika.

Aminocaprinsäure: s. Epsilon-A.

Aminogalaktose: syn. Galaktosamin*.


Aminogruppe: $-\text{NH}_2$.

Aminosäurediabetes (δισαβίωσ gehe hindurch) (Debré, de Toni, Fanconi 1936): syn. chronische Aminoazidurie; rezessiv erbliche Stoffwechselanomalie* mit vermehrter Aminosäureausscheidung (Hyperaminoazidurie*) auf Grund eines Enzymmangels (Phosphatase, Phosphorylase) in den Nierentubuli (proximale Abschnitte?).

Kann mit einem Phosphatdiabetes kombiniert auftreten als nephrotisch-glykosurischer Minderwuchs* mit hypophosphatämischer Rachitis (s. u. Phosphatstörung).

Aminosäuren: Einfachste Bausteine der Eiweißkörper*; Carbonsäuren, bei denen ein H durch eine Aminogruppe $-\text{NH}_2$ ersetzt ist.

Die im Eiweißstoffwechsel wichtigen A. sind fast alle α -A. u. L-A. Allgem. Formel:



Zwei A. bilden durch Peptidbindung ein Dipeptid, drei ein Tripeptid, bis zu 10 ein Oligopeptid, mehr als 10 ein Polypeptid, über 100 ein Protein. — Im Körper sind 25 Aminosäuren bekannt, davon sind 10 essentiell (Valin, Leucin, Isoleucin, Methionin, Threonin, Phenylalanin, Tryptophan, Histidin, Arginin, Lysin). 1. **Aliphatische A.:** Threonin, Isoleucin, Methionin, Valin, Leucin (Mono-A.); Lysin, Arginin (Di-A.). 2. **Aromatische A.:** Phenylalanin (isozyklisch); Histidin, Tryptophan (heterozyklisch); ferner: **glukoplastische A.:** Können in d. Leber zu Glucose umgebaut werden, z. B. Glykokoll, Alanin, Arginin, Glutaminsäure usw.; vgl. Gluconeogenese; **ketoplastische A.:** Können in d. Leber Azetonkörper bilden, z. B. Leucin, Tyrosin, Isoleucin u. Phenylalanin.

Aminosäuresequenz (sequi folgen): Primärstruktur der Proteine* (Aufklärung der ersten größeren Sequenz: Insulin, Sanger 1954).

p-Amino-Salicylsäure (PAS): s. Para-Amino-Salicylsäure.

Aminosäureoxydasen: Enzyme, die die oxydative Desaminierung von Aminosäuren katalysieren; Flavoproteide*. Vgl. Eiweißstoffwechsel. Aus d. Aminosäure entsteht unter Abgabe von 2 H-Atomen eine Iminosäure, die dann zur Ketosäure u. Ammoniak hydrolysiert wird.

Aminosidin: syn. Paromomycin*.

Aminozucker: Die Hydroxylgruppe e. Monosaccharids* wird durch eine Aminogruppe ersetzt, z. B. Glucosamin*, Galaktosamin*. Bausteine hochmolekularer Naturstoffe, z. B. von Chitin, Hyaluronsäure.

Aminurie: Ausscheidg. v. Aminen i. Harn b. meist gleichzeitig. Aminoazidurie* u. Diaminurie*. Bei Erkrankg. d. intermediären Stoffwechsels (z. B. b. m.).